Médicament RHINADVIL MAUX DE GORGE

Dans quel cas le médicament RHINADVIL MAUX DE GORGE est-il prescrit ?

Ce collutoire contient un anti-inflammatoire d'action locale et un antiseptique.
Il est utilisé dans le traitement d'appoint des affections de la gorge et de la bouche (maux de gorge peu intenses et sans fièvre, aphtes...)..

Présentations du médicament RHINADVIL MAUX DE GORGE

RHINADVIL MAUX DE GORGE : suspension pour pulvérisation buccale (arôme orange) ; flacon de 12 ml (66 doses) avec embout buccal

Composition du médicament RHINADVIL MAUX DE GORGE

	p 100 ml
Tixocortol pivalate	333 mg
Chlorhexidine digluconate	143 mg

Substances actives : Chlorhexidine gluconate solution, Tixocortol pivalate
Excipients : Cétylpyridinium chlorure, Éthanol, Fructose, Glucose, Glycérol, Gomme arabique, Orange arôme, Potassium, Potassium acésulfame, Sodium benzoate, Sucre inverti

Contre-indications du médicament RHINADVIL MAUX DE GORGE

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 6 ans.

Attention

En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours, de douleur en avalant ou en cas d'apparition de fièvre, consultez votre médecin. Il pourra faire la différence entre une pharyngite et une angine. En cas d'angine bactérienne, un traitement antibiotique est nécessaire afin d'éviter des complications ultérieures, cardiaques ou rénales.
L'usage prolongé des traitements antiseptiques locaux (gargarisme, collutoire, pastille) n'est pas souhaitable ; il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la gorge.
Interactions du médicament RHINADVIL MAUX DE GORGE avec d'autres substances
Il est généralement inutile d'associer des antiseptiques différents. Ceux-ci peuvent être contenus dans de nombreux produits disponibles en automédication : pastille, collutoire et solution nasale ; demandez conseil à votre pharmacien.

Fertilité, grossesse et allaitement

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Mode d'emploi et posologie du médicament RHINADVIL MAUX DE GORGE

Agiter le flacon avant l'emploi.
Posologie usuelle :

- Adulte et enfant de plus de 6 ans : 1 ou 2 pulvérisations, 3 ou 4 fois par jour.

La durée du traitement ne doit pas dépasser 5 jours sans avis médical.

Conseils

Chez le jeune enfant, la pulvérisation peut provoquer un spasme du larynx : n'introduisez pas trop profondément l'embout dans sa bouche.

Effets indésirables possibles du médicament RHINADVIL MAUX DE GORGE
Irritation locale (picotements) en début de traitement.
Rarement : réaction allergique.
Vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d'être dû à ce médicament, vous pouvez le déclarer en téléchargeant le formulaire.
Laboratoire Pfizer Holding France

Pharmacie Paget
2 rue Pasteur
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02
Fax 05.63.38.96.10
pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité